
Ouchtata n°6

Vass7R04s481-485



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp840

1.14 A3
Ouchtata 6





Année: 1976
Emplacement . 1.: 14. A 3. Désignation Ouchtata Nº6

! ! Nombre ! Total	DATES!
	22-3 : 25-3 : ! ! !
1 1	
2 1) provins	
3 1	
4 1 3	1 2 4 1 9
5 !	
	D & 25-3.76

Année: 1977
Emplacement ... 1. 14 A3 Désignation Ouchtala no 6

	! Nombre !	DATES								
	Total d'yeux	7.3	10-3		! !	!!!!				
1	: 3	1	1		!	!!!!				
2	! 2	Q.	1 <		103	+4				
3	1 3	2.	3 ×	ple	!					
4	. 3	ð	! ! D							
5	! !		! !	! !	! ! ======	: :===================================	=====			

Année: 1978

Emplacement 1.14 A 3 Désignation / Quehtata nº6

+5

!!!	The same place species again	! Nombre ! ! Total !			D A T	ES			== ! ! t
!!!		1 divenx	16-3		!	!	- !	- <u>!</u>	-! >
!!	1	\$ 3	2.		!!	!	!	!!	
!!!	2	89			!!	!	!!!	!	!
!	3	£ 4	2.		!!	!!!	!!	!!!	!!
!!!	4	5	1.		!!	!	!!	!	!
1	5	1			!		!	!!	!!
==		::		- And grow arms glock good arms for a man grow arms glock good store and	ple	16 -3	-78		==

-	THE STATE COMES COMES THE STATE OF THE STATE		and the same of th		A COUNTY COUNTY COMES AND ASSESSMENT OF THE COUNTY OF	THE COME WHEN THE RESERVE WHEN A SHEET WHEN BOTH THE STATE OF THE STAT						
		! ! Nombre ! Total	! !	DATES								
			15.3	193		! ! ! !	<u>!</u> <u>!</u>					
	1	4	0	2			1					
	2	f	1				!	!				
	3	4	1 1	3 '			1 1	1 1				
	4	3	! 0	1		! ! !	!	1 1				
	5	1 8	!		Dle	19 3-75	(+3)!	energy mark				

ANNEE 1989

NOM Ouchtata w6 EMPLACEMENT 1. MA A3

10 R9 s 591.595

Souche	Nbre yeux	Débourr début m	Nbre grap	Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v	Maturité
1 2 3 4 5 Å	5 5 8 4 4 26		5 5 12 4 5 31	12	24.5	\$4.5 0	30.5			

Mill: Pourriture:

Port: Mi origia Vigueur: exten Conlune

ANNEE 199 EMPLACEMENT long 9 1591. 595 NOM Ouchtata No 6 Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 4 263 29.3. 2

4 263 29.3. 2

5 9.6 146 176

4 18.3 29.3. 4

Grappe: G - M - P Dim: Compa

6 18.3 21.3. 1

Pour: Mill:

H 18.3 21.3. 1

Baie: TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

P-Cr-Rs-Rg-N Just: inc Compacité : L - M- C Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 1 26.3.91 Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: Lengen conche Vigueur: 45

ANNEE 1992

NOM Gulhtata Nº6 EMPLACEMENT 1 14 A3

10 K 9 A 5 31. 595

			The second desiration is the second district to the second of the second desiration of the secon								
Souche	Nbre						Véraison début mi/v fin			Maturité	
2 3 4 5	66544		6 10 1	Crappe Four: Baie: Couleu Saveur Pépins Port:	: G - TG - disc- : B- : s - : ave	M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1 : - P D 1-ov- Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus ox - he	yl-fus : inc		L-M-C

ANNEE 1993

MOM

ni buchtata ot

EMPLACEMENT 1.14 A3

10 R 9 A 591 - 595

q/esoulées

		N 6		1, 1, 2,2
Souche	Nbre	Débourrement Nbre début mi/déb grap	Ferti- lité	Floraison Véraison Maturité début mi/f fin début mi/v fin
1 2	6	1	. 1,5	28-5 1,6 3-6
3 4 f	4	2	Grappe Pour :	e: G - M - P Dim : Compacité: L - M -C
5	3	0		TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
			Saveur	s: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré s: s - m - ar - fox - herb s: avec - apyrène
			Port :	tould Vigueur : 3
			,	

ANNEE: 1994

NOM Buchtata nº 6 EMPLACEMENT 1 1443 - Coulees

ni-

Souche	Nbre yeux	mi/deb	libre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité				
1	2		6	4											
2	5		2												
3	2		0	Grappe	: G	М - Р	Dim	:	Compac	cité	: L - M-				
Ą	2		3	Pour :	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M- Pour: Mill:										
5	3		1	Baie:	TC - 0 disc-s _l				-fus						
				Couleu	<u>r</u> : B-0	Gr-Rs-	Rg-N	đus :	inc -	- col	oré				
				Saveur	: s -	m - a	r - fo	ox - he	erb						
				Pépins	: avec	- ap	yrène								
	*			Fort: Vigueur:											

AMMER: 1996

HOM Buchtata nos EMPLACEMENT. 10 R91591.595

2 22 3 25 3 6 29.5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6	ni	-											
2	iche												Haturit€
	1 2 3 4 5	23223	223 223 183 183 223	25.3. 25.3. 25.3. 25.3.	5	Grappe Four : Baie : Couleu Saveur	295 : G - C disc-sp r : B-C : s -	3,6 +4 M - P Mil ; - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P 1 -ov-ol Rg-N r - for yrène	in: bov-cyl dus box - he	Compacture inc	cité	: I, - /:- C

Désignation :

Suchtata m = 6 1-14A34-4

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen (2)- globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ()- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 fauflages à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calue 74

Désignation : Emplacement : -Cuchtata 4:6 1-14 A 3 s - 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Dduveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calusty

-Guchtata nº 6 1.14A3 s-4

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Blace rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Désignation :

4

1-14A3 A-4

Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -<u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -36 plissée au point pétiolaire 6.

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3/entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1) partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Conclutata nº 6 1-14434-4 DENOMINATION : EMPLACEMENT : SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (6), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

m Désignation: Ouchtata 6 No d'ordre : Origine : Emplacement: d1 pl 14 A3 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) 9 - L₁/L (1) - 2 - 3. 10 - L₂/L ① - ② 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1-2-3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B 1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L'₃ ①-②-③ 1 - 2 - (3) - (4) - (5) 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - (2) - 3. Direction

: 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domerque 80